

健康中心

新冠疫情升溫請注意

疾病管制署提醒，國內新冠疫情仍處相對高點，且死亡病例數持續上升，提醒民眾不可掉以輕心，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮擁擠室內場所，建議自主佩戴口罩；如有生病建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得佩戴口罩，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

新冠疫情升溫請注意

具重症風險因子對象

⚠️ 65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史者
為感染新冠後可能導致
併發症之高風險對象

👉 如有發燒或呼吸道症狀請儘速就醫
以利醫師及早診治並開立**抗病毒藥物**
降低感染後引發併發症或導致死亡之風險

衛生福利部疾病管制署 2025.05 製

國內新冠疫情上升幅度趨緩，但重症和死亡病例數增加，50 歲以上新冠住院人次亦仍呈上升趨勢，提醒民眾不可掉以輕心，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去 24 小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg 或無發燒之情形下心跳>100 次/分鐘，請務必立刻就醫。

新冠疫情升溫請注意

新冠重症警示症狀

👉 8大警訊：

- 喘或呼吸困難
- 皮膚、嘴唇或指甲床發青
- 無法進食、喝水或服藥
- 過去24小時無尿或尿量顯著減少
- 無發燒之情形下心跳>100次/分鐘
- 持續胸痛或胸悶
- 意識不清
- 收縮壓<90mmHg

★ 有以上症狀請務必立刻就醫

衛生福利部疾病管制署 2025.05 製

新冠疫情升溫請注意

兒童新冠重症警示徵象

👉 發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請儘速就醫

⚠️ 若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時請立即送醫治療

衛生福利部疾病管制署 2025.05 製

疾管署說明將持續每週配送疫苗以應民眾接種需求。請年齡滿 6 個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另為因儘速提升 65 歲以上長者、55-64 歲原住民、免疫不全者等 3 類高風險對象免疫保護力，自 6 月 11 日起第 2 劑間隔調整為 2 個月 (60 天)，請符合資格者踴躍接種。有關疫苗接種院所及最新防疫政策等訊息，可至疾管署全球資訊網首頁「新冠最新防疫專區」查閱，或撥打免付費防疫專線 1922(0800-001922)洽詢。

資料來源：衛生福利部疾病管制署

健康中心關心您